

Les 7 étapes à suivre en **libéral** en cas d'**Accident d'Exposition au Sang**

C'est quoi un accident d'exposition au sang ?

Tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang.



Piqûre, coupure



Projection muqueuse



Peau lésée

1

ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LE SOIN

Ne pas faire saigner !



2


LAVER ET DESINFECTER IMMÉDIATEMENT

- Laver à l'eau et au savon **pendant 5 min.**
- Rincer abondamment.
- Désinfecter après séchage ou immersion **pendant 5 min** avec Dakin, bétadine dermique ou alcool 70°.
- Si projection muqueuse : rincer **5 min** avec eau/sérum physiologique.



3

EVALUER LE RISQUE INFECTIEUX



Piqûre profonde, aiguille creuse, souillée avec du sang, IV

Piqûre avec aiguille pleine ou IM ou SC

Piqûre par collecteur surchargé, crachats, morsures, griffures

4

DECLARER L'AES SUR WEB AES-VILLE

<https://aes-ville.chu-besancon.fr>

Web AES Ville est une plateforme développée par l'Ordre Infirmiers, accessible depuis votre application E-CPS avec votre n°RPPS. Elle permet aux IDEL de saisir et documenter les AES. L'objectif est de constituer une base de données qui permettra de connaître la typologie des AES pour identifier et prioriser les actions de prévention destinées à diminuer le risque en ville.

Les 7 étapes à suivre en libéral en cas d'Accident d'Exposition au Sang

5

EFFECTUER LES PRELEVEMENTS

Prélèvements sanguins dans un tube sec :

- de l'IDEL victime
- du patient source avec son **consentement écrit et signé**

Il est recommandé d'effectuer les sérologies VIH, hépatite B et C. Le tube sec se garde 48h max au réfrigérateur.

NB : Depuis le 1er janvier 2022, le dépistage du VIH est accessible sans avance de frais et **sans ordonnance**, sur simple demande et sans rendez-vous, dans **tout laboratoire de biologie médicale**. Cela signifie que le test est **pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie**.

Télécharger le modèle de consentement



6

CONSULTER DANS LES 24H MAX



Objectif : évaluer le risque infectieux et le risque de contamination pour mettre en place un traitement si besoin.

Seul le prélèvement sanguin à 6 semaines permettra de déterminer une contamination.

Semaine, heures ouvrables : CeGIDD

Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic VIH, hépatites et IST

- CeGIDD Nord-Est : CHU Félix Guyon : 0262 90 55 69
- CeGIDD Ouest (CEPS) : CHOR : 0262 74 23 80
- CeGIDD Sud : CHU GHSR : 0262 35 96 10
- CHM Mayotte : Service des Maladies Infectieuses : 0269 61 80 00 poste 3828

Week-end, jours fériés, nuit : URGENCES hospitalières

- Nord : CHU Félix Guyon : 0262 90 57 32
- Est : GHER : 0262 98 88 84 IOA / 0262 98 88 86
- Ouest : CHOR : 0262 74 21 00
- Sud : CHU GHSR : 0262 35 90 00 poste 5 7721/5 5040 ou demander les urgences
- Mayotte : CHM : 0269 61 80 00

Médecin traitant

L'IDEL victime de l'AES informe son médecin de traitement. Le médecin traitant peut aussi réaliser le suivi régulier.



7

L'ACCIDENT DU TRAVAIL

1. **Prise en charge des frais médicaux** : prise en charge à 100% des frais médicaux liés à l'AES à condition d'avoir souscrit à l'Assurance Volontaire Accident du Travail (AVAT) de la CGSS ou d'un assureur privé.
2. **En cas d'arrêt de travail** : envoi dans les 48 h au service médical de la CGSS **pour percevoir des indemnités journalières à compter du 4ème jour**.
3. **CARPIMKO** : Déposer l'arrêt initial et les prolongations sur votre espace personnel pour percevoir des indemnités journalières à compter du 91ème jour.

OPTION : **Prévoyance** (assurance privée) pour percevoir des indemnités journalières complémentaires à celles de l'Assurance Maladie.

