# Les 5 étapes de reconstitution avant l'administration d'IXCHIQ® [1]

IXCHIQ®
(VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA, VIVANT)

## ÉTAPE 1

- Retirer le capuchon de la seringue
- **Fixer une aiguille** sur le cône Luer de la seringue

## ÉTAPE 2

- Nettoyer le bouchon du flacon
- **Transférer lentement la totalité du contenu de la seringue préremplie** (solvant) dans le flacon (poudre)

## ÉTAPE 3 ET 4

- **Agiter** doucement le flacon pour dissoudre la poudre (ne pas secouer ni retourner le flacon)
- **Attendre au moins 1 minute** pour la reconstitution complète du vaccin

## ÉTAPE 5

- Après la reconstitution, incliner légèrement le flacon et **prélever la totalité du contenu** (0,5mL) du vaccin reconstitué dans la même seringue. Ne pas retourner le flacon afin de permettre le prélèvement complet du volume reconstitué

**Flashez ce QR code pour accéder à une vidéo de reconstitution**

## INFORMATIONS IMPORTANTES

- **Présentation sans aiguille :** il est nécessaire de **prescrire une aiguille Luer Lock** (22-25 g d'une longueur d'au moins 40 mm).
- Après reconstitution, IXCHIQ® doit être administré par voie intramusculaire dans les 2 heures.
- S'il n'est pas utilisé dans les 2 heures, le vaccin reconstitué doit être jeté*. D'un point de vue microbiologique, le vaccin doit être utilisé immédiatement. S'il n'est pas utilisé immédiatement, les durées et conditions de conservation en cours d'utilisation relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

- **Surveillance du patient pendant et après la vaccination :**
  - La vaccination doit être reportée chez les personnes souffrant d'une maladie fébrile aiguë sévère ou d'une infection aiguë.
  - La présence d'une infection mineure et/ou d'une fièvre légère ne doit pas retarder la vaccination.
  - L'effecteur doit disposer d'un traitement médical approprié en cas de réaction anaphylactique.
  - Tenir compte du risque de réactions liées à l'anxiété, pour éviter toute blessure due aux évanouissements.
  - Après la vaccination, le patient doit rester sous surveillance pendant au moins 15 minutes.

**IXCHIQ® est indiqué dans l'immunisation active pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans ou plus.[1] L'utilisation de ce vaccin devra être conforme aux recommandations officielles lorsqu'elles seront disponibles.[1] Il n'y a pas de recommandation vaccinale d'utilisation d'IXCHIQ® disponible à ce jour, un dossier est en cours d'évaluation auprès de la HAS.**

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou toute erreur médicamenteuse à votre Centre Régional de PharmacoVigilance (CRPV) ou sur https://signalement.social-sante.gouv.fr. Voir la rubrique « Effets indésirables » pour les modalités de déclaration des effets indésirables.

1. Résumé des Caractéristiques du Produit IXCHIQ®, 28 juin 2024 * Conformément aux directives locales en matière de déchets pharmaceutiques.

Pour une information complète sur IXCHIQ®, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit en flashant ce QR code ou directement sur le site internet : https://www.ema.europa.eu/

Non remboursable et non agréé aux collectivités à la date du 29 juillet 2024 (demande d'admission à l'étude pour l'agrément aux collectivités).
Liste I. Médicament soumis à prescription médicale.

valneva

FR-XIC-240002 - 24/10/6795234/PM/002 - Octobre 2024