

Calendrier

Injections retard

EVOLUTION DES TRAITEMENTS ET DE LA PREP

Certains patients **séropositifs** au VIH peuvent bénéficier de **traitements injectables à longue durée d'action** (1 inj. Cabotégravir + 1 inj. Rilpivirine), administrés **toutes les 8 semaines**.

- ➔ La première injection est réalisée à **l'hôpital**
- ➔ Les injections suivantes peuvent être réalisées **en ville** par l'infirmier libéral du patient

La **PrEP (prophylaxie pré-exposition)** est un **traitement de prévention** destiné aux **personnes à risque d'exposition** au VIH. Une forme injectable (1 inj. Cabotégravir) est disponible et peut constituer une alternative à la prise quotidienne de comprimés.



INDÉTECTABLE = INTRANSMISSIBLE

Lorsqu'une personne vivant avec le VIH bénéficie d'un traitement, sa **charge virale devient indétectable** ➔ le virus ne se transmet pas.





RÔLE DES IDEL

Les IDEL s'assurent du suivi médical régulier du patient et de l'absence de contre-indications (**millepertuis** en vente libre). Ils peuvent être amenés à réaliser ces injections à **domicile ou au cabinet, toutes les 8 semaines**.



Recommandations pour la réalisation de l'injection

- 1 Sortir le produit du réfrigérateur** 20 min avant l'injection
- 2 Agiter** vigoureusement pendant 10 secondes
- 3 Aspirer 1 ml** d'air dans la seringue puis injecter l'air pour faciliter l'aspiration du liquide
- 4 Installer le patient** en décubitus latéral
- 5 Insérer l'aiguille dans la zone ventro-glutéale** (mieux tolérée car moins innervée et vascularisée que le quart supéro-externe)
- 6 Utiliser la technique d'injection adaptée à un produit visqueux :**
 - "Technique en Z" afin d'éviter une fuite du produit au point d'injection
 - Injection lente (≈ 20 secondes)
- 7 Volume injecté :** 3 ml par injection, une injection par site
- 8 Reprogrammer** l'injection 8 semaines après (tolérance ± 7j)



Copyright © 2023 reussistonlfi.fr |



Facturation IM proposée :

- **PreP - 1 injection : AMI 1 + MAU + IFD**
- **VIH - 2 injections curatives patient immunodéprimé : AMI 1,5 + AMI 1,5/2 + IFD**

Calendrier Injections PrEP

Injections	Date prévue	Date injections	Localisation / produit	Commentaires	Initiales IDEL
Injection d'initiation M0 A l'hôpital			Cabotégravir ☐ Droite ☐ Gauche		
Injection d'initiation M1 A l'hôpital			Cabotégravir ☐ Droite ☐ Gauche		
Injection d'entretien M3 A l'hôpital ou en ville			Cabotégravir ☐ Droite ☐ Gauche		
Injection d'entretien M5 A l'hôpital ou en ville			Cabotégravir ☐ Droite ☐ Gauche		
Injection d'entretien M7 A l'hôpital ou en ville			Cabotégravir ☐ Droite ☐ Gauche		
Injection d'entretien M9 A l'hôpital ou en ville			Cabotégravir ☐ Droite ☐ Gauche		
Injection d'entretien M11 A l'hôpital ou en ville			Cabotégravir ☐ Droite ☐ Gauche		

Calendrier

Injections traitement VIH

Injections	Date prévue	Date injections	Localisation / produit	Commentaires	Initiales IDEL
Injection d'initiation M0 A l'hôpital			Cabotégravir ☐ Droite ☐ Gauche Rilpivirine ☐ Droite ☐ Gauche		
Injection d'initiation M1 A l'hôpital ou en ville			Cabotégravir ☐ Droite ☐ Gauche Rilpivirine ☐ Droite ☐ Gauche		
Injection d'entretien M3 A l'hôpital ou en ville			Cabotégravir ☐ Droite ☐ Gauche Rilpivirine ☐ Droite ☐ Gauche		
Injection d'entretien M5 A l'hôpital ou en ville			Cabotégravir ☐ Droite ☐ Gauche Rilpivirine ☐ Droite ☐ Gauche		
Injection d'entretien M7 A l'hôpital ou en ville			Cabotégravir ☐ Droite ☐ Gauche Rilpivirine ☐ Droite ☐ Gauche		
Injection d'entretien M9 A l'hôpital ou en ville			Cabotégravir ☐ Droite ☐ Gauche Rilpivirine ☐ Droite ☐ Gauche		
Injection d'entretien M11 A l'hôpital ou en ville			Cabotégravir ☐ Droite ☐ Gauche Rilpivirine ☐ Droite ☐ Gauche		